

## CALENDARIO DE VACUNACIONES Y REPESCAS

**DTPa:** 2-4-11 m (Hexaval) + 6 a (DTPa/Tdpa-IPV) + 14 a (dT/Tdpa)+dT 65 a.

Catch up: >6 sem: 5D DTPa/Hexaval (0-2-8 m) +Tdpa 6 a ( mín 6 m) + dT/Tdpa 14 a  
>7 a: 3 D (1Tdpa+2 dT) 0-1-8 m; revacunar en 10 a x 2 veces. Emb:1DTdpa 32s qemb

-Heridas sucias(tierra/heces/saliva, punzantes, avulsión, bala, quemadura, congelación): >5 a postvacunaT: 1 D dT/dTpa;  
(IgT si no constan 3 D vacuna T). -Heridas limpias y menores:> 10 a postvacunaT: 1 D dT/dTpa. No IgT

**IPV:** 2-4-11 m (Hexaval) + 6 a (DTPa-IPV).

Catch up: >6 sem-3a : 0-2-8 m Hexaval/IPV + 6 a Tdpa-IPV

>4 a: 0-1-8 m.

>4 a con vacunación virus vivos oral completa: 1 D IPV

**Hib:** 2-4-11 m (Hexaval)

7-11m: 3 D c1-2 m (ó Hexaval 0-2-8 m) 12-14m:2 D c 1-2m 15m-5a: 1D.

**VHB:** 2-4-11 m (Hexaval)

Catch up: >2 m: 0-1-6 m (0-2-8 m Hexaval) (dosis adulto >16 a).

**VHA:** Catch up: >12 m: 0-6 m ( *Havrix 720* <19 a, *Vaqta 25* <18 a).

**RTV:** *RV5 / RotaTeq®MSD*: 2-4-6 m ó *RV1 / Rotarix®GSK*: 2-4 m. *financiada PP 37-42 s*

Catch up: >6-12 sem: 0-1-2 m(teq). Fin: 24 s (rix)/32 s (teq)

**SRP:** 12m-3 a (con SRPV)

Catch up: >12 m: 0-1 m.

**VVAR:** 15 m-3 a(con SRPV)

Catch up: 1-12 a: 2 D c 3 m. 13-60 a: 2 D c 1m.

**VPH:** >9 a: 0-6 m.

Catch up: *Cervarix(2) y Gardasil 9*: 2 D c 6 m. >15 a: 0-1 ó 2-6 m.

*Gardasil (4)*: 2 D c 6 m. >13 a: 0-1-6m.

**VMC:** 4-12 m-12 a (última dosis intercambiable VMCWY)

Catch up: 2-12 m:2 D c 2 m + 12 a >12 m:1D + 12 a >10 a: 1 D

**VMACWY:** 11-19a: 1 D

Catch up previo a vacunación en viaje a países de riesgo o FR EMI:

>6 sem: 2 D 0-2 + 1 D 12 m; >6 m: 1 D + 1 D 12 m ( mín 2 m intervalo); >12 m: 1 D

En >6 sem: MenACYW-TT (Nimenrix) En >2 a: MenACYW-CRM (Menveo) ,

**VMB:** *Financiada en déf properdina complemento, asplenia o disf. grave (a. c' s falcif., personal lab. o EMI previa)*

MenB-4C ( Bexsero):3-12 meses: 3 D (2 D c 2 m + 1 D entre 12-15 m (mín 2 m intervalo))

1-2 años: 3 D (2 D c 2 m + 1D 1-2 a tras última dosis.

>2 a: 2 D c 1 m. No revacunación.

Men B-Fhbp (Trumenba): >10 a: 2 D c 6 m

**PNV 13:** 2-4-11 m.

Catch up:<6 m: 2 D c 2 m+ 1 D 12 m, >1 a: 2D c 2 m, 2-5 a: 1 D

>5 a riesgo: 2 D c 2 m PNV 13- PNV 23, ó 2 D c 12 m PNV 23-PNV13.

**PNV 23:** >2: 1 D+1 D >65 a (mín 5 a)

**Grip 4:** 6 m-15 a: 1 D (= 0.5ml). *Repetir en primov <9 a:2 D c 1 m. Vaxigrip Tetra®* ,

**Abreviaturas:** DTPa/Tdpa (difteria, tetanos, tos ferina), IgT: gammaglobulina antitetánica, IPV(polio parenteral), Hib (Haemophilus influenzae tipo B), VHB (hepatitis B), VHA (hepatitis A), RTV (rotavirus), SRP (triple vírica: sarampión, rubeola, parotiditis), SRPV (tetra vírica: triple y varicela) VVAR (varicela),VPH (papilomavirus), VMC(meningococo C), VMCWY (meningo tetravalente)VMB (meningococo B), PNV 13 (neumococo 13 valente), PNV 23 (neumococo 23 valente), Grip 3 (gripe trivalente).